

RECOMENDACIÓN 4

BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE EFECTOS DESEABLES E INDESEABLES Guía de Práctica Clínica Alivio del Dolor por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos - 2017

PREGUNTA 4.- ALIMENTACIÓN PARENTERAL O ENTERAL ASISTIDA VERSUS ALIMENTACIÓN SEGÚN TOLERANCIA DE VÍA ORAL EN CÁNCER AVANZADO

Pregunta solicitada: En niños y adultos con cáncer avanzado sin disponibilidad de vía oral en la fase final de vida, ¿Se debe entregar alimentación enteral asistida o parenteral, en lugar de alimentación según tolerancia de la vía oral?

BÚSQUEDA DE LA EVIDENCIA

Se realizó una búsqueda general de revisiones sistemáticas asociadas al tema de “Cuidados Paliativos”. Las bases de datos utilizadas fueron: Cochrane database of systematic reviews (CDSR); Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE); HTA Database; PubMed; LILACS; CINAHL; PsychINFO; EMBASE; EPPI-Centre Evidence Library; 3ie Systematic Reviews and Policy Briefs Campbell Library; Clinical Evidence; SUPPORT Summaries; WHO institutional Repository for information Sharing; NICE public health guidelines and systematic reviews; ACP Journal Club; Evidencias en Pediatría; y The JBI Database of Systematic Reviews and implementation Reports. No se aplicaron restricciones en base al idioma o estado de publicación. Dos revisores de manera independiente realizaron la selección de los títulos y los resúmenes, la evaluación del texto completo y la extracción de datos. Un investigador experimentado resolvió cualquier discrepancia entre los distintos revisores. En caso de considerarse necesario, se integraron estudios primarios.

Seleccionadas las revisiones sistemáticas o estudios primarios asociadas a la temática, se clasificaron en función de las potenciales preguntas a las que daban respuesta. Los resultados se encuentran alojadas en la plataforma Living Overview of the Evidence (L-OVE). Por lo tanto, al momento de definir la pregunta, la evidencia ya se encontraba clasificada según intervenciones que comparadas.

SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA

Análisis de los componentes de la pregunta en formato PICO

POBLACIÓN

Niños o adultos con cáncer terminal en la fase final de la vida

INTERVENCIÓN

Alimentación asistida (enteral o parenteral).

COMPARACIÓN

Alimentación por vía oral, según tolerancia.

DESENLACE (OUTCOME)

Síntomas, calidad de vida

Resumen de la evidencia identificada

Una revisión sistemática Cochrane [1] no identificó ningún estudio aleatorizado o controlado-prospectivo evaluando esta intervención.

Tabla resumen de la evidencia identificada

Revisión Sistemática	1 [1]
Estudios primarios	0

Ver resultados de "[Palliative care](#)" en plataforma L-OVE

Estimador del efecto

No aplica

Metanálisis

No aplica

Tabla de Resumen de Resultados (Summary of Findings)

ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL EN FASE FINAL DE LA VIDA				
Pacientes: Niños o adultos con cáncer avanzado sin disponibilidad de vía oral en la fase final de vida				
Intervención: Alimentación enteral asistida o parenteral				
Comparación: Alimentación por vía oral según tolerancia				
Desenlaces	Efecto relativo (IC 95%)	Impacto	Certeza de la evidencia (GRADE)	Mensajes clave en términos sencillos
Síntomas o calidad de vida	--	No se identificaron estudios.	--	No se identificaron estudios.

GRADE: grados de evidencia del GRADE Working Group.

Fecha de elaboración de la tabla: 11/11/2017

Referencias

1. Phillip Good, Russell Richard, William Syrmis, Sue Jenkins-Marsh, Jane Stephens. Medically assisted nutrition for adult palliative care patients. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014;4(4):CD006274.