

BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE EFECTOS DESEABLES E INDESEABLES
Guía de Práctica Clínica Enfermedad de Parkinson tratamiento farmacológico
y quirúrgico 2017

**Pregunta 8.- Agonista dopaminérgico más levodopa comparado con levodopa
en enfermedad de Parkinson de novo**

Pregunta solicitada: En personas con enfermedad de Parkinson de novo, ¿Se debe usar agonistas dopaminérgicos + levodopa en comparación a usar levodopa?

BÚSQUEDA DE LA EVIDENCIA

Se realizó una búsqueda general de revisiones sistemáticas asociadas al tema de “Parkinson's disease”. Las bases de datos utilizadas fueron: Cochrane database of systematic reviews (CDSR); Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE); HTA Database; PubMed; LILACS; CINAHL; PsychINFO; EMBASE; EPPI-Centre Evidence Library; 3ie Systematic Reviews and Policy Briefs Campbell Library; Clinical Evidence; SUPPORT Summaries; WHO institutional Repository for information Sharing; NICE public health guidelines and systematic reviews; ACP Journal Club; Evidencias en Pediatría; y The JBI Database of Systematic Reviews and implementation Reports. No se aplicaron restricciones en base al idioma o estado de publicación. Dos revisores de manera independiente realizaron la selección de los títulos y los resúmenes, la evaluación del texto completo y la extracción de datos. Un investigador experimentado resolvió cualquier discrepancia entre los distintos revisores. En caso de considerarse necesario, se integraron estudios primarios.

Seleccionadas las revisiones sistemáticas o estudios primarios asociadas a la temática, se clasificaron en función de las potenciales preguntas a las que daban respuesta. Los resultados se encuentran alojadas en la plataforma Living Overview of the Evidence (L-OVE). Por lo tanto, al momento de definir la pregunta, la evidencia ya se encontraba clasificada según intervenciones que comparadas.

RESUMEN DE LA EVIDENCIA IDENTIFICADA

Análisis de los componentes de la pregunta en formato PICO

POBLACIÓN

Personas con enfermedad de Parkinson (EP) en etapa inicial

INTERVENCIÓN

Agonistas dopaminérgicos (ropinirol, rotigotina o pramipexol) + levodopa

COMPARACIÓN

Levodopa

DESENLACE (OUTCOME)

Mejoría de síntomas (escala UPDRS), discinesias, efectos adversos, abandonos

Resumen de la evidencia identificada

Si bien existen múltiples revisiones sistemáticas evaluando el efecto de los agonistas dopaminérgicos, con o sin levodopa, ninguno de los ensayos identificados en estas compara la pregunta de interés.

Tabla resumen de la evidencia identificada

Revisiones sistemáticas	0
Estudios primarios	0

Estimador del efecto

No aplica

Metanálisis

No aplica

Tabla de Resumen de Resultados (Summary of Findings)

No aplica

Fecha: 10/01/2018