



Subsecretaría de Salud Pública
División de Planificación Sanitaria
Departamento Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia

Proceso de actualización de Guías de Práctica Clínica

Formulación y priorización de preguntas clínicas

Guía de Práctica Clínica GES “Vicios de refracción en personas de 65 años y más”

La División de Prevención y Control de Enfermedades en conjunto con la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud han iniciado un proceso de revisión de vigencia y actualización de las recomendaciones contenidas en las guías de práctica clínica GES. Este proceso se divide en 2 etapas, siendo la primera de ellas la revisión de vigencia de las recomendaciones. Una vez evaluadas la vigencia, comienza a la actualización propiamente tal, proceso que se inicia con la formulación de preguntas para cada una de las guías de práctica clínica.

A continuación se describen los resultados del proceso de formulación de la Guía de Práctica Clínica GES “**Vicios de refracción en personas de 65 años y más**” 2017.

La formulación de preguntas se realizó en agosto de 2017 en una reunión presencial en el Ministerio de Salud, donde participaron profesionales representantes de la Sociedad Chilena de Oftalmología, Hospital San Juan de Dios, FONASA y Depto. Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud. Los participantes formularon 4 preguntas para la actualización de esta guía clínica, utilizando el formato PIC (Población, Intervención, Comparación).

1. ¿En personas de 65 años y más se debe realizar examen visual una vez al año en comparación a no realizar?
2. ¿En personas de 65 años y más sometidas a examen de agudeza visual con resultado menor a 0.8 corregida se debe realizar examen completo por oftalmólogo (agudeza visual, tensión ocular, fondo de ojo, biomicroscopía, motilidad ocular) en comparación a no realizar?

3. ¿En personas de 65 años y más con diagnóstico de vicio de refracción (anisometropía, astigmatismo, queratocono) deben usar lentes de contacto en comparación a usar lentes ópticos?
4. ¿En personas de 65 años y más se debe realizar screening objetivo de agudeza visual para detectar vicios de refracción en comparación a no realizar?

Participaron en la formulación de las preguntas los siguientes profesionales:

1. Tomás Rojas, Hospital San Juan de Dios.
2. Edgardo Sánchez, Hospital San Juan de Dios.
3. Cristian Cumsille Hospital San Juan de Dios.
4. Verónica Medina, FONASA.
5. Catherine Moll, Depto. Enfermedades No Transmisibles (DIPRECE).