

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más - 2018

Pregunta N°1. En personas mayores de 15 años con sospecha de hipertensión arterial, ¿Debe realizarse el diagnóstico de HTA mediante monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas (MAPA) o mediante el perfil de presión arterial?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación, se muestran los precios referenciales. Es preciso considerar que éstos fueron recogidos con el único objetivo de constituir un antecedente aproximado de “Monitoreo de presión arterial de 24 horas MAPA” y “Perfil de presión arterial”, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar respecto a los costos de la misma. Estos precios no deben ser utilizado para fines diferentes.

Tabla N°1. Precios referenciales

Ítem	Monitoreo de presión arterial de 24 horas MAPA	Perfil de presión arterial
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista (diagnóstico)	\$ 5.153*	\$ 5.153 x2 consultas= \$ 10.306
Consulta o control médico integral en atención primaria (diagnóstico)	\$ 4.439*	\$ 4.439 x2 consultas= \$ 8.878
Monitoreo continuo de presión arterial	\$15.531	----

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

*Precios referenciales considerando un control al momento de instalación de equipo y otro control para entrega de resultados.

Referencias:

1. Precios obtenidos de la base de datos del Estudio de Verificación de Costos 2015 MINSAL. El precio fue actualizado utilizando la UF al 1 de julio 2018.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.