

INFORME PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Tratamiento Conservador No Dialítico de La Enfermedad Renal Crónica - 2018

Nº 2 EN PERSONAS CON ENFERMEDAD CRÓNICA EN ETAPA 5 EN TRATAMIENTO CONSERVADOR NO DIALÍTICO CON ACIDOSIS METABÓLICA ¿SE DEBE USAR BICARBONATO MAYOR O IGUAL A 20MMOL/L EN COMPARACIÓN A USAR BICARBONATO MENOR O IGUAL A 20MMOL/L

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias usar bicarbonato bicarbonato mayor o igual a 20mmol/L y al uso de bicarbonato menor o igual a 20mmol/L de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no se debe ser utilizado para otros fines.

Ítem	Usar de bicarbonato mayor o igual a 20mmol/L	Usar de bicarbonato menor o igual a 20mmol/L
*Bicarbonato de sodio 1 gr Caja con 60 capsulas	¹ \$60 precio unitario por capsula 1 capsula =1g 1 caja con 60 capsulas = \$3.780	¹ \$60 precio unitario por capsula 1 capsula =1g 1 caja con 60 capsulas = \$3.780

Fuente:

¹ *Recetario Magistral*

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile. Santiago; 2014: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>