

INFORME PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Tratamiento Conservador No Dialítico de la Enfermedad Renal Crónica - 2018

N° 4 EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ETAPA 5 EN TRATAMIENTO CONSERVADOR NO DIALÍTICO ¿SE DEBE USAR ESTATINAS EN COMPARACIÓN A NO USAR?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias, de “usar hipolipemiantes” y no usar hipolipemiantes”, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

| Uso de Hipolipemiantes | Precio ¹ |
|--|---------------------|
| Estatinas: Astrovastatina 20mg | \$18 por comprimido |
| Lovastatina 20mg | \$8 por comprimido |

Referencia

1.-Mercado Público precio unitario + IVA

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile. Santiago; 2014: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>