

INFORME PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Tratamiento Conservador No Dialítico de la Enfermedad Renal Crónica - 2018

N°5 En personas con Enfermedad Renal crónica en etapa 5 en tratamiento conservador no dialítico ¿Se debe usar vitamina D en comparación a no usar?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los costos referenciales, es preciso considerar que estos costos fueron recogidos con el único objetivo de constituir un antecedente aproximado del usar vitamina D y no usar vitamina D de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Ítem	Vitamina D	No usar Vitamina D
Fármacos	Vitamina D Colcalcifero 50.000 UI ¹ en polvo \$7.400 por sobre	----
	Vitamina D3 50.000UI ¹ (colecalfierol) Cada sachet \$2.500	

Referencias

¹ Cadena de farmacia

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile. Santiago; 2014: <http://www.bibliotecamisal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>