

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Retinopatía del Prematuro- 2018

1. ¿En recién nacidos menores de 32 semanas o menores de 1500 g sin diagnóstico de retinopatía del prematuro, se debe detener el tamizaje de búsqueda de retinopatía del prematuro (examen de fondo de ojo) cuando se comprueba vascularización normal en zona III y cumplidas las 37 semanas de EGC, en comparación a repetir el examen de fondo de ojo hasta la vascularización total de la retina cumplidas las 45 semanas de EGC?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de detener tamizaje de búsqueda de retinopatía del prematuro cuando se comprueba vascularización normal en zona III cumplidas las 37 semanas de EGC y de repetir el examen de fondo de ojo hasta la vascularización total de la retina cumplidas las 45 semanas de EGC, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.

Tabla N°1. Precios referenciales*

Ítem	Detener tamizaje de búsqueda de retinopatía del prematuro cuando se comprueba vascularización normal en zona III y cumplidas las 37 semanas de EGC	Repetir el examen de fondo de ojo hasta la vascularización total de la retina cumplidas las 45 semanas de EGC
Retinopatía Del Prematuro seguimiento de pacientes no quirúrgicos. Exploracion vitreoretinal , ambos ojos	$\$8.610^1 \times 2,5^{**} =$ \$21.525	$\$ 8.610^1 \times 6,5=$ \$ 55.965
Total	\$21.525	\$ 55.965

*El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

**Se realizan 2,5 exámenes durante tamizaje y luego 4 exámenes más por niño= 6,5 exámenes, según panel de expertos.

Referencias:

1. *Modalidad Libre Elección FONASA (MLE) 2018*