

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Retinopatía del Prematuro- 2018

5. ¿En recién nacidos menores de 32 semanas o menores de 1500g con retinopatía del prematuro etapa 3 en cualquier zona o cualquier etapa en zona I, se debe realizar control semanal con oftalmoscopia indirecta o retinografía digital, en comparación a control, cada 2 semanas o más con oftalmoscopia indirecta o retinografía digital?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de realizar control semanal con oftalmoscopia indirecta y de realizar control, cada 2 semanas o más con oftalmoscopia indirecta o retinografía digital de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla N°1. Precios referenciales*

Ítem ¹	Realizar control semanal con oftalmoscopia indirecta o retinografía digital	Realizar control, cada 2 semanas o más con oftalmoscopia indirecta o retinografía digital
Exploración vitreoretinal, ambos ojos	\$ 8.610 x 4 semanas= \$ 34.440	\$ 8.610x2 semanas= \$ 17.220
Retinografía digital ambos ojos (para registro)	\$ 10.590 x 4 semanas= \$ 42.360	\$ 10.590x 2 semanas= \$ 21.180
Consulta médica de especialidad en oftalmología	\$ 20.540 cada vez	\$20.540 cada vez

*El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Referencias:

1. Arancel Modalidad Libre Elección (MLE) FONASA 2018

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.