

RECOMENDACIÓN T.5

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Cáncer Colorrectal en Personas de 15 años y más - 2018

PREGUNTA: EN PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER COLORRECTAL EN ETAPA IV, SIN TRATAMIENTO PREVIO ¿SE DEBE USAR QUIMIOTERAPIA MÁS CETUXIMAB EN COMPARACIÓN A SÓLO QUIMIOTERAPIA?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias de usar quimioterapia más cetuximab en comparación a sólo quimioterapia, de modo que el equipo elaborador de la guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla N° 1 PRECIOS REFERENCIALES

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de las prestaciones sanitarias, dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

ítem	precio unitario
Examen de detección de mutación K-RAS (EXONES 2 y 3) ¹	\$ 537.212
Quimioterapia riesgo intermedio alto costo, por ciclo (FOLFIRI-Cetuximab) ^{2*}	\$ 5.117.320

* Se estimó un costo mensual de Cetuximab 500 mg/m² cada 15 días (considerando una superficie corporal típica 1,7), al usarlo con FOLFOX o FOLFIRI.

Referencias:

1. Precio indicado por Clínica Privada (Clínica Alemana, 2018).
2. Costos incluye IVA estimado en "Estudio de Costo FONASA" (FONASA, 2018)

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.