

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Retinopatía del Prematuro- 2018

2. ¿En recién nacidos menores de 32 semanas o menores de 1500g con retinopatía del prematuro diagnosticada en cualquier estadio con enfermedad plus, estadio 3 en zona I sin plus y estadio 3 en zona II con enfermedad plus, se debe realizar panfotocoagulación laser retinal, en lugar de no tratar?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de realizar panfotocoagulación laser retinal, en lugar de no tratar en recién nacidos menores de 32 semanas o menores de 1500g con retinopatía del prematuro diagnosticada en cualquier estadio con enfermedad, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla N°1.

Item ¹	Valor (Cada vez)	Valor (ambos ojos x 2 veces)
Retinopatía del prematuro: Fotocoagulación	\$601.470	\$2.405.880

*El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Referencias:

1.- Programa de prestaciones valoradas (PPV) 2018

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.