

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Retinopatía del Prematuro- 2018

3. ¿En recién nacidos menores de 32 semanas o menores de 1500g con retinopatía del prematuro diagnosticada con necesidad de tratamiento en zona I, retinopatía agresiva posterior y condiciones clínicas que impidan el uso de láser, se debe usar anti angiogénicos intra vítreos, en lugar de hacer panfotocoagulación laser retinal?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de usar antiangiogénicos intra vítreos y de hacer panfotocoagulación laser retinal en recién nacidos menores de 32 semanas o menores de 1500g con retinopatía del prematuro diagnosticada con necesidad de tratamiento en zona I, retinopatía agresiva posterior y condiciones clínicas que impidan el uso de láser, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.

Tabla N°1. Precios referenciales*

Ítem	Usar antiangiogénicos intra vítreos	Panfotocoagulación laser retinal
ANTIANGIOGÉNICOS <i>Bevacizumab 100mg/4ml vial</i>	\$ 376.515¹	----- -----
FOTOCOAGULACIÓN		\$601.470² cada vez

*El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Referencias:

1. Mercado público. Precio más IVA 2018
2. Programa prestaciones valoradas (PPV) 2018