

## INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

### Guía de Práctica Clínica

#### Infarto Agudo al Miocardio con supradesnivel del segmento ST – 2018

**Pregunta 6. "En personas con Infarto Agudo al Miocardio con Supradesnivel del Segmento ST (SDST) tratados con trombolíticos ¿se debe realizar coronariografía y eventual angioplastía precoz en comparación a realizar coronariografía y eventual angioplastía tardía? \*precoz: 24 a 48 hrs; tardío: mayor a 48 horas.**

No se encontraron estudios que respondieran la pregunta desde la perspectiva de valores y preferencias de pacientes o cuidadores.

### TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
Filtro: (("Information (Base)")[Journal] OR "information"[All Fields]) AND ("health services needs and demand"[MeSH Terms] OR ("health"[All Fields] AND "services"[All Fields] AND "needs"[All Fields] AND "demand"[All Fields]) OR "health services needs and demand"[All Fields] OR "needs"[All Fields]) AND ("patients"[MeSH Terms] OR "patients"[All Fields]) AND ("angioplasty"[MeSH Terms] OR "angioplasty"[All Fields])) AND ("2008/09/16"[PDat] : "2018/09/13"[PDat])	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	10
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados	0