



SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica “Leucemia Crónica en personas mayores de 15 años” año 2018.

Pregunta N°6: En personas mayores de 15 años con Leucemia Mieloide Crónica refractario a inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) a primera y segunda línea sin mutación T315I ¿Se debe utilizar Bosutinib en comparación a no usar Bosutinib?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los costos referenciales, es preciso considerar que estos costos fueron recogidos con el único objetivo de constituir un antecedente aproximado de bosutinib de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar respecto a los costos de la misma. Estos precios no deben ser utilizados para otros fines.

Tabla N°1. Precio referencial de Bosutinib. *

	\$
Bosutinib 1 dosis mensual	1.800.000

*El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación(es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

— Precio obtenido de información de experta del panel. Dra. Rojas

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile. Santiago; 2014: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>