

RECOMENDACIÓN T.2

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE COSTO-EFECTIVIDAD

Guía de Práctica Clínica de Linfoma de Hodgkin en personas mayores de 15 años – 2018

PREGUNTA. EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS CON LINFOMA DE HODGKIN ETAPA LOCALIZADA CON PET INTERINO NEGATIVO ¿SE DEBE UTILIZAR ABVD SIN RADIOTERAPIA EN COMPARACIÓN CON RADIOTERAPIA?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” es la relación entre la efectividad y los costos de las intervenciones a evaluar.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó la búsqueda de estudios que abordaran la costo-efectividad cuando la intervención fuera considerada un tratamiento o diagnóstico de alto costo¹. La búsqueda consideró revisiones sistemáticas que evaluaran la costo-efectividad de utilizar ABVD sin radioterapia en comparación a ABVD más radioterapia en personas de 15 años y más con Linfoma de Hodgkin etapa localizada con PET interino negativo. Se identificaron términos MESH y términos de texto libre asociados a la población. La búsqueda consideró estudios publicados en inglés, en bases de datos Pubmed

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se seleccionaron las evaluaciones económicas que utilizaran como método la costo utilidad, costo efectividad y costo minimización.

No se encontraron estudios para esta pregunta.

¹ Anual \$2.418.399 y Mensual \$201.533. Ministerio de Salud. Decreto 80: Determinar umbral nacional de costo anual al que se refiere el artículo 6° de la Ley 20.850 [Internet]. Santiago; 2015 Nov.