

RECOMENDACIÓN T.4 INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica de Linfoma de Hodgkin en personas mayores de 15 años – 2018

Preguntas. En personas de 15 años o más con linfoma de Hodgkin con patología pulmonar ¿Se debe utilizar esquema doxorubicina, vinblastina y dacarbazina (AVD) en comparación a utilizar el esquema doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina (ABVD)?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los costos referenciales, es preciso considerar que estos costos fueron recogidos con el único objetivo de constituir un antecedente aproximado de etopósido, metilprednisolona, citarabina y cisplatino (ESHAP) comparado con 6 ciclos de doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina (ABVD) de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar respecto a los costos de la misma. Estos precios no deben ser utilizados para otros fines.

Tabla N°1. Precio referencial.

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación(es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

	ESHAP 3 CICLOS	ABVD 6 CICLOS
Total	404.045	1.274.388

REFERENCIAS

- Precios de metilprednisolona, cisplatino, doxorubicina, bleomicina y dacarbazina obtenidos de la base de datos del Estudio de Verificación de Costos 2015 MINSAL. El precio fue actualizado utilizando la UF al 1 de julio 2018.
- Precio de etopósido, citarabina y vinblastina obtenidos de Mercado Público 2018

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile. Santiago; 2014: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>