



SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

RECOMENDACIÓN T.6

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica de Linfoma No Hodgkin en personas de 15 años y más – 2018

Pregunta: En personas de 15 años y más con linfoma no Hodgkin (LNH) folicular en remisión parcial o completa ¿Se debe realizar mantención con rituximab por 2 años en comparación a no realizar mantención con rituximab por 2 años?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones de** personas de 15 años y más con linfoma no Hodgkin (LNH) folicular en remisión parcial o completa respecto a realizar mantención con rituximab por 2 años en comparación a no realizar.

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo,

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un resumen por pregunta, a continuación un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

SÍNTESIS DE EVIDENCIA

Un estudio ensayo prospectivo aleatorizado realizado en Alemania, tuvo por objetivo evaluar la calidad de vida en personas con Linfoma de Hodgkin en terapia de mantenimiento con rituximab (8 ciclos de rituximab 375 mg / m² cada 3 meses) versus la observación en pacientes con linfoma no Hodgkin de células B CD20 +. Entre julio de 2002 y diciembre de 2005, se incluyeron 122 pacientes en el ensayo. La calidad de vida se evaluó con los cuestionarios estandarizados EORTC-QLQ-C30, EuroQol-5D y EuroQol-5D (VAS) en 91 pacientes (1).

Después del análisis estadístico con la prueba exacta de la suma de rangos de Wilcoxon, no encontramos diferencias significativas de la Calidad de vida entre el grupo de tratamiento con rituximab y el grupo de observación (1).

REFERENCIA

1. Witzens-Harig M, Reiz M, Heiss C, Benner A, Hensel M, Neben K, et al. Quality of life during maintenance therapy with the anti-CD20 antibody rituximab in patients with B cell non-Hodgkin's lymphoma: results of a prospective randomized controlled trial. *Ann Hematol.* 2009 Jan;88(1):51-7.

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
<p>((((quality of life) OR ("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation" [Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities" [tiab] OR "patient* utility" [tiab] OR "health utility" [tiab] OR "health utilities" [tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab]))) AND "Lymphoma, Non-Hodgkin"[Mesh]) AND (((rituxan) OR mabthera) OR rituximab)</p>	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	143
N° de artículo seleccionados por título/abstract	3
N° de artículos seleccionados	1
2. Términos de búsqueda	
<p>(tw:(tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de la Comunidad)) OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Satisfacción del Paciente)) OR (tw:(Prioridad del Paciente)) OR (tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR (tw:(Satisfacción del consumidor)) OR (tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)) OR (tw:(Notificación a los Padres)))) AND (tw:(linfoma no hodgkin)) AND (tw:(rituximab)) OR (tw:(rituxan)) OR (tw:(mabthera))</p>	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Lilacs
N° de artículos obtenidos	87
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados	0