

RECOMENDACIÓN T.7

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica de Linfoma No Hodgkin en personas de 15 años y más - 2018

PREGUNTA: En personas de 15 años y más con linfoma no Hodgkin de células B refractarios o en recaída ¿Se debe usar otro anticuerpo monoclonal anti CD20 en comparación a usar rituximab en segunda y tercera línea?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los costos referenciales, es preciso considerar que estos costos fueron recogidos con el único objetivo de constituir un antecedente aproximado de rituximab y obinutuzumab, para que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar respecto a los costos de la misma. Estos precios no deben ser utilizados para otros fines.

Tabla N°1. Precio referencial de Rituximab y Obinutuzumab.

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación(es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

ítem	\$
Rituximab	8.797.488
Obinutuzumab	18.128.800

REFERENCIAS

- Precio de rituximab obtenido de la base de datos del Estudio de Verificación de Costos 2015 MINSAL. El precio fue actualizado utilizando la UF al 1 de julio 2018.
- Precio de Obinutuzumab obtenido de Mercado público.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile. Santiago; 2014: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>