

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Prevención de la Progresión de la Enfermedad Renal Crónica - 2018

N°1. EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ETAPA 3-4) CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA SECUNDARIA ¿SE DEBE REALIZAR TRATAMIENTO CON ERITROPOYETINA EN COMPARACIÓN A NO REALIZAR TRATAMIENTO?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias de “usar eritropoyetina y no usar eritropoyetina”, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla N° 1

Ítem	Precio Eritropoyetina ¹
Eritropoyetina Ampolla 2000 UI	\$ 1.129 cada ampolla
Eritropoyetina Ampolla 4000 UI	\$ 1.790 cada ampolla

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación(es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Referencias:

1 .Precio promedio compra centralizada CENABAST

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.