

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Prevención de la Progresión de la Enfermedad Renal Crónica - 2018

N°2 EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ETAPA 2-4) CON ACIDOSIS METABOLICA O BICARBONATO MENOR DE 22MMOL/L ¿SE DEBE USAR BICARBONATO EN COMPARACIÓN A NO USAR BICARBONATO?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias de “usar bicarbonato y no usar bicarbonato”, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla N° 1

| Ítem | Usar de bicarbonato mayor o igual a 22mmoL/L | Usar de bicarbonato menor o igual a 22mmol/L |
|--|--|--|
| *Bicarbonato de sodio 1 gr Caja con 60 capsulas | ¹ \$63 precio unitario por capsula 1 capsula =1g 1 caja con 60 capsulas = \$3.780 | ¹ \$63 precio unitario por capsula 1 capsula =1g 1 caja con 60 capsulas = \$3.780 |

Fuente:
Recetario Magistral

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.