

## INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

### Guía de Práctica Clínica Prevención de la Progresión de la Enfermedad Renal Crónica - 2018

#### **N°5 EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ETAPA 1-4) CON ÁCIDO ÚRICO ALTO ¿SE DEBE REALIZAR TRATAMIENTO HIPOURICEMIANTE EN COMPARACIÓN A NO REALIZAR TRATAMIENTO?**

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación<sup>1</sup>.

#### **PRECIOS REFERENCIALES**

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias de “realizar tratamiento hipouricemiante y no realizar tratamiento”, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

**Tabla N° 1 Tratamiento hipouricemiante**

ITEM	Precio Mercado Público + IVA *
Alopurinol	\$31 por comprimido
Colchicina	\$25 por comprimido
Febixostat	\$343 por comprimido

Referencias:  
Mercado Público 2018

<sup>1</sup> Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.