

## INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

### Guía de Práctica Clínica Prevención de la Progresión de la Enfermedad Renal Crónica - 2018

#### N°7 EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ¿SE DEBE USAR PREBIÓTICOS EN COMPARACIÓN A NO USAR?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación<sup>1</sup>.

#### PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias de “usar prebióticos en comparación a no usar”, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla N° 1

Item	Valor prebióticos (frasco o caja) <sup>1</sup>
Insulina;lactobacillus acidophilus;lactobacillu	\$12.000
	\$5.570
Insulina 150g en polvo	\$4.490
Insulina 350g en polvo	\$7.000
Insulina 400g en polvo	

#### Referencias:

1. Farmacia Privada

<sup>1</sup> Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.