Octubre, 2018

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Hemodiálisis - 2018

N°5 EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPA 5 EN HEMODIÁLISIS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL ¿SE DEBEN USAR BETABLOQUEADORES EN COMPARACIÓN A USAR INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA (IECA)?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación[1].

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación, se muestran los precios referenciales de usar beta-bloqueadores en comparación a usar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) en personas con enfermedad renal crónica en etapa 5, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar respecto a los costos de la misma. Estos precios no deben ser utilizados para otros fines

Tabla N°1. Precios referenciales

I **Betabloqueadores adrenérgicos Beta:**	**Precio($) por comprimido[1]**
A.-Cardioselectivos:	
Nebivolol	$282
Atenolol	$8
Bisoprolol	$393
Metoprolol	$357
B.- No Cardioselectivos	
Propanolol	$17
Carvedilol	$42

[1] Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.

II. IECA	**Precio por comprimido[1]**
captopril	$23
Enalapril	$10
Lisinopril	$345

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación(es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Fuente:

1. Precio Mercado público +IVA