

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica Peritoneodiálisis

Nº6 ¿EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 3 A 4 NEW YORK HEART ASSOCIATION (NYHA) ¿SE DEBE REALIZAR PERITONEODIÁLISIS EN COMPARACIÓN A REALIZAR TRATAMIENTO MÉDICO?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** de personas con enfermedad renal crónica respecto realizar peritoneodiálisis en comparación a realizar tratamiento médico.

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitidos y se realizó un resumen por pregunta, a continuación un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

SINTESIS DE EVIDENCIA

No se identificó evidencia directa para contestar esta pregunta, por lo que se consideró evidencia proveniente de pacientes en diálisis de 65 años y más sin insuficiencia cardiaca que evaluó el inicio de diálisis y decisiones sobre modalidad

Se completó un total de 31 entrevistas con 23 pacientes de hemodiálisis en centro asistencial, 1 paciente en hemodiálisis en el hogar y 7 pacientes en diálisis peritoneal. La edad promedio fue de 76 ± 9 años.

Surgieron dos temas dominantes (experiencias en toma de decisiones-satisfacción y barreras para toma de decisiones compartidas), además de subtemas relacionados (experiencias en toma de decisiones negativas versus positivas, lucha por autonomía, ser un "buen paciente" y falta de opciones).

A pesar de creer que la iniciación de diálisis debería ser elección del paciente, ningún paciente percibió que había tomado una decisión. Los pacientes explicaron que esa situación se debió a percepción de muerte inminente o que la decisión de comenzar la diálisis pertenecía a los médicos. Los autores concluyen que muchos pacientes mayores no sabían que el inicio de la diálisis era voluntario, tenían creencias erróneas sobre su pronóstico y no participaban en la toma de decisiones, lo que provoca una baja satisfacción (1)

BIBLIOGRAFÍA

1. Ladin K, Lin N, Hahn E, Zhang G, Koch-Weser S, Weiner DE. Engagement in decision-making and patient satisfaction: a qualitative study of older patients' perceptions of dialysis initiation and modality decisions. *Nephrol Dial Transplant*. 2017 Aug 1;32(8):1394-1401.

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
<p>FILTRO: <i>"Patients preferences in dialysis, decisions about dialysis modality"</i>. Últimos cinco años.</p> <p>((("patients"[MeSH Terms] OR "patients"[All Fields]) AND preferences[All Fields] AND ("renal dialysis"[MeSH Terms] OR "renal"[All Fields] AND "dialysis"[All Fields]) OR "renal dialysis"[All Fields] OR "dialysis"[All Fields] OR "dialysis"[MeSH Terms]) AND ("Decisions"[Journal] OR "decisions"[All Fields]) AND ("renal dialysis"[MeSH Terms] OR ("renal"[All Fields] AND "dialysis"[All Fields]) OR "renal dialysis"[All Fields] OR "dialysis"[All Fields] OR "dialysis"[MeSH Terms]) AND modality[All Fields]) AND ("2013/09/02"[PDat] : "2018/08/31"[PDat]))</p>	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	10
N° de artículo seleccionados por título/abstract	1
N° de artículos seleccionados finales	1