

RECOMENDACIÓN T.10

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA TRASTORNO BIPOLAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS – 2018

PREGUNTA. EN PERSONAS CON TRASTORNO BIPOLAR EN FASE DE MANTENCIÓN CON EMBARAZO EN CURSO (SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE) ¿SE DEBE USAR LITIO COMO MONOTERAPIA EN COMPARACIÓN A USAR ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS COMO MONOTERAPIA?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones de usar litio como monoterapia en comparación a usar antipsicóticos atípicos como monoterapia, de modo que el equipo elaborador de la guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla N° 1 PRECIOS REFERENCIALES

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de las prestaciones sanitarias, dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Fármacos	Estabilizadores del ánimo antipsicóticos atípicos	Litio
Risperidona 3 mg - cm ¹	\$32,3	-
Quetiapina 100 mg - cm ¹	\$62,3	-
Olanzapina 10 mg - cm ¹	\$84,1	-
Clozapina 100 mg - cm ¹	\$180,0	-
Aripiprazol 15 mg - cm ¹	\$229,1	-
Litio carbonato 300 mg - cm ¹	-	\$99,6
Rango de precio por comprimido	\$32,3 a \$229,1	\$ 99,60
Rango de precio mensual por un comprimido mensual	\$969 a \$6.872	\$ 2.988,00

Referencia

1. Precio de compra por Establecimientos de Salud Públicos a través de plataforma Mercado Público, al 2018. Precio incluye IVA.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.