

RECOMENDACIÓN T.8

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA TRASTORNO BIPOLAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS – 2018

PREGUNTA: EN PERSONAS CON DEPRESIÓN BIPOLAR MIXTA ¿SE DEBE USAR ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS COMO MONOTERAPIA EN COMPARACIÓN A NO USAR?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones de “usar antipsicóticos atípicos como monoterapia” en comparación a “usar otro estabilizador del ánimo como monoterapia”, de modo que el equipo elaborador de la guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla N° 1 PRECIOS REFERENCIALES

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de las prestaciones sanitarias, dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Fármacos		\$ por comprometido
Estabilizadores del ánimo antipsicóticos	Risperidona 3 mg - cm ¹	\$32,3
	Quetiapina 100 mg - cm ¹	\$62,3
	Olanzapina 10 mg - cm ¹	\$84,1
	Clozapina 100 mg - cm ¹	\$180,0
	Aripiprazol 15 mg - cm ¹	\$229,1
	Ziprasidona 40 mg -cm ²	\$2.620,0

Referencia

1. Precio de compra por Establecimientos de Salud Públicos a través de plataforma Mercado Público, al 2018. Precio incluye IVA.
2. Precio de compra en Farmacia, al 2018, incluye IVA.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.