


Cuándo sospechar de DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA



	DENGUE	CHIKUNGUNYA	ZIKA
Criterio Epidemiológico	Persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue o áreas con presencia de mosquito Aedes.	Persona que durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas ha estado en zonas donde la infección por chikungunya es epidémica, endémica o en áreas con presencia de mosquito Aedes.	Persona que durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas haya estado en zonas donde la infección por virus Zika es epidémica, endémica o en áreas con presencia de mosquito Aedes.
Criterio Clínico	<p>Presenta fiebre >38.5°C. y repentina, normalmente de 2 a 7 días de duración, y presenta dos o más de las siguientes manifestaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Náuseas, vómitos. Exantema. Mialgias, artralgia. Cefalea, dolor retroorbitario. Petequias o prueba de torniquete positiva. Leucopenia. Cualquier signo de alarma. Cualquier criterio de gravedad del dengue. 	<p>Presenta fiebre >38.5°C. y artralgias (habitualmente incapacitante) o artritis acompañada de dolor intenso, incapacitante, que no se explica por otras condiciones médicas.</p> <p>La artralgia es la manifestación característica de chikungunya, ocasionando en algunos casos la discapacidad y postración.</p>	<p>Presenta exantema de inicio agudo (casi siempre motivo de la consulta, cuyo primer signo suele ser pruriginoso, maculopapular y céfalo-caudal), que no tenga otra explicación y presenta dos o más de las siguientes manifestaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fiebre, generalmente < 38.5°C. Conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival. Artralgias. Mialgias. Edema periarticular. <p>Ocasionalmente se pueden presentar manifestaciones neurológicas, como Síndrome Guillain Barré.</p>
Observaciones	Cuando la fiebre baja y se mantiene a 37.5°C o menos, y no se observa mejoría, debe sospecharse que la enfermedad no ha terminado de evolucionar y que puede sobrevenir la fase crítica del dengue.	Ocasionalmente los casos agudos pueden estar acompañados de manifestaciones no articulares, tales como neurológicas, cardiovasculares, dermatológicas, oftalmológicas, hepáticas, renales, respiratorias y hematológicas, entre otras. O pueden presentar disfunción de al menos un órgano o sistema, con riesgo vital.	En el caso de recién nacidos que manifiesten una infección congénita por virus Zika (por ejemplo, microcefalia), se debe interrogar a la madre para determinar si durante el período de gestación, estuvo en zonas donde la infección por virus Zika es epidémica o endémica.

Signos y síntomas característicos de ARBOVIROSIS



- En el dengue, la caída de la fiebre entre el tercer y el quinto día de la enfermedad puede asociarse al inicio de la gravedad.
- El choque en el dengue es de rápida instalación y aparece más frecuentemente entre el tercer y el séptimo día de la enfermedad.

SIGNOS Y SINTOMAS	DENGUE	CHIKUNGUNYA	ZIKA
Motivo de consulta más frecuente	Fiebre, mialgias	Dolor articular, fiebre	Exantema o prurito
Fiebre	Moderada Muy frecuente Duración: 5 a 7 días	Intensa Muy frecuente Duración: 3 a 5 días	Leve Muy poco frecuente Duración: 1 a 3 días
Exantema	Aparece del 5º al 7º día No característico	Aparece al 2º o 3º día No característico	Típicamente desde el día 1 Máculopapular, céfalo-caudal
Prurito	Leve a intenso	Leve a moderado	Moderado a intenso
Conjuntivitis	Poco frecuente	Muy poco frecuente En Niños es más frecuente	Muy frecuente
Manifestaciones neurológicas	Poco frecuente	Poco frecuente (puede ser frecuente y grave en neonatos)	Posible y grave
Cefalea	Intensa y frecuente	Leve a moderada	Leve a moderada
Dolor retroocular	Intenso y frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente
Poliartralgias	Ausente	Muy frecuente	Frecuente
Poliartritis	Ausente	Frecuente	Frecuente
Edema de manos y pies	Poco frecuente	Frecuente	Poco frecuente
Evolución a cronicidad	No	Muy frecuente	No descrito
Mialgias	Muy frecuente e intensa	Frecuente Moderada a intensa	Poco frecuente
Hepatomegalia	Signos de alarma	Muy poco frecuente	Muy poco frecuente
Vómitos frecuentes	Signos de alarma	Muy poco frecuente	Muy poco frecuente
Diarrea	Frecuente	Muy poco frecuente	Muy poco frecuente
Dolor abdominal intenso	Signos de alarma	No se presenta	No se presenta
Sangrado de la piel	Frecuente	Muy poco frecuente	Muy poco frecuente
Sangrado de mucosas	Signo de alarma	Muy poco frecuente (cuando se presenta es grave)	Muy poco frecuente
Choque	Es la forma grave más frecuente	Poco frecuente	No se conoce
Leucopenia	Moderada a intensa	Leve a moderada	Leve a moderada
Proteína C reactiva	Normal	Elevada	Elevada
Hematocrito elevado	Es un signo de alarma	Poco frecuente	Poco frecuente
Recuento plaquetario	Normal a muy bajo	Normal a bajo	Normal a bajo
Consideraciones particulares	Riesgo de muerte	Puede evolucionar a Artropatía crónica	Riesgo de infección congénita Y Síndrome Guillain Barré