

RECOMENDACIÓN TRATAMIENTO

BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE EFECTOS DESEABLES E INDESEABLES

Guía de Práctica Clínica del Consumo Perjudicial o Dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y otras drogas en personas menores de 20 años - 2018

A. PREGUNTA CLÍNICA

En personas con trastorno por uso de alcohol y otras drogas (consumo perjudicial/dependencia) ¿Debe realizarse tratamiento por periodo superior a 3 meses en comparación a realizar tratamiento por periodo menor a tres meses?

Análisis y definición de los componentes de la pregunta en formato PICO

Población: Personas con trastorno por uso de alcohol y otras drogas (consumo perjudicial/dependencia).

Intervención: Tratamiento por periodo superior a 3 meses.

Comparación: Tratamiento por periodo menor a tres meses.

Desenlace (outcome): Impacto clínico.

B. BÚSQUEDA DE EVIDENCIA

Se realizó una búsqueda general de revisiones sistemáticas asociadas al tema de “Alcohol abuse and dependence”. Las bases de datos utilizadas fueron: Cochrane database of systematic reviews (CDSR); Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE); HTA Database; PubMed; LILACS; CINAHL; PsycINFO; EMBASE; EPPI-Centre Evidence Library; 3ie Systematic Reviews and Policy Briefs Campbell Library; Clinical Evidence; SUPPORT Summaries; WHO institutional Repository for information Sharing; NICE public health guidelines and systematic reviews; ACP Journal Club; Evidencias en Pediatría; y The JBI Database of Systematic Reviews and implementation Reports. No se aplicaron restricciones en base al idioma o estado de publicación. Dos revisores de manera independiente realizaron la selección de los títulos y los resúmenes, la evaluación del texto completo y la extracción de datos. Un investigador experimentado resolvió cualquier discrepancia entre los distintos revisores. En caso de considerarse necesario, se integraron estudios primarios.¹

Seleccionadas las revisiones sistemáticas o estudios primarios asociadas a la temática, se clasificaron en función de las potenciales preguntas a las que daban respuesta. Al momento de definir la pregunta la evidencia ya se encontraba previamente clasificada según intervenciones comparadas. Los resultados se encuentran alojados en la plataforma Living Overview of the Evidence (L·OVE), sistema que permite la actualización periódica de la evidencia.

¹ Para revisar la metodología, las estrategias y los resultados de la búsqueda, favor revisar el informe “Búsqueda sistemática de evidencia de los efectos deseables e indeseables” en la sección de método de la Guía de Práctica Clínica respectiva.

C. SÍNTESIS DE EVIDENCIA

Resumen de la evidencia identificada

No se identificaron revisiones sistemáticas que respondan la pregunta de interés. Se extendió la búsqueda a través de síntesis amplia, guías clínicas y citación cruzada sin identificar estudios de interés.

Tabla 1: Resumen de la evidencia seleccionada

Revisión Sistemática	0
Estudios primarios	0

Estimador del efecto

No aplica.

Metanálisis

No aplica.

Tabla de Resumen de Resultados (Summary of Findings)

TRATAMIENTO DURANTE 3 MESES COMPARADO CON TRATAMIENTO POR PERIODO MENOR A TRES MESES PARA TRASTORNO POR USO DE ALCOHOL Y DROGAS.			
Pacientes	Personas con trastorno por uso de alcohol y otras drogas (consumo perjudicial/dependencia).		
Intervención	Tratamiento durante durante 3 meses.		
Comparación	Tratamiento por periodo menor a tres meses.		
Desenlaces	Efecto	Certeza de la evidencia (GRADE)	Mensajes clave en términos sencillos
Impacto clínico*	No se identificaron estudios que evalúen la pregunta de interés.	--	--
GRADE: Grados de evidencia Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. *Impacto clínico se refiere a cualquier desenlace que tenga impacto directo o indirecto en el manejo de los pacientes (tales como adherencia, abstinencia, reducción del patrón de consumo, calidad de vida, disminución de conductas de riesgo conducta delictiva, sexual, funcionalidad psicosocial). Fecha de elaboración de la tabla: Enero, 2019.			

Referencias

No aplica