

RECOMENDACIÓN 2

BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE EFECTOS DESEABLES E INDESEABLES

Guía de Práctica Clínica del Consumo Perjudicial o Dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y otras drogas en personas menores de 20 años - 2018

A. PREGUNTA CLÍNICA

Pregunta clínica original:

En personas menores de 20 años con trastorno por uso de alcohol y otras drogas (consumo perjudicial/dependencia) ¿Se deben realizar intervenciones grupales fuera de espacios de salud (barrio/escuela) en comparación a intervenciones grupales dentro de espacios de salud?

Pregunta clínica reformulada:

En personas menores de 20 años con trastorno por uso de alcohol y otras drogas (consumo perjudicial/dependencia) ¿Se deben realizar intervenciones psicosociales fuera de espacios de salud (barrio/escuela) en comparación a realizar intervenciones psicosociales dentro de espacios de salud?

Análisis y definición de los componentes de la pregunta en formato PICO

Población: Personas menores de 20 años con trastornos por uso de alcohol y otras drogas.

Intervención: Realizar intervenciones psicosociales fuera de espacios de salud (barrio/escuela).

Comparación: Realizar intervenciones psicosociales dentro de espacios de salud.

Desenlace (outcome): Adherencia, abstinencia, reducción del patrón de consumo, calidad de vida, disminución de conductas de riesgo (conducta delictiva, sexual), funcionalidad psicosocial.

B. BÚSQUEDA DE EVIDENCIA

Se realizó una búsqueda general de revisiones sistemáticas asociadas al tema de “Alcohol abuse and dependence”. Las bases de datos utilizadas fueron: Cochrane database of systematic reviews (CDSR); Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE); HTA Database; PubMed; LILACS; CINAHL; PsycINFO; EMBASE; EPPI-Centre Evidence Library; 3ie Systematic Reviews and Policy Briefs Campbell Library; Clinical Evidence; SUPPORT Summaries; WHO institutional Repository for information Sharing; NICE public health guidelines and systematic reviews; ACP Journal Club; Evidencias en Pediatría; y The JBI Database of Systematic Reviews and implementation Reports. No se aplicaron restricciones en base al idioma o estado de publicación. Dos revisores de manera independiente realizaron la selección de los títulos y los resúmenes, la evaluación del texto completo y la extracción

de datos. Un investigador experimentado resolvió cualquier discrepancia entre los distintos revisores. En caso de considerarse necesario, se integraron estudios primarios.¹

Seleccionadas las revisiones sistemáticas o estudios primarios asociadas a la temática, se clasificaron en función de las potenciales preguntas a las que daban respuesta. Al momento de definir la pregunta la evidencia ya se encontraba previamente clasificada según intervenciones comparadas. Los resultados se encuentran alojados en la plataforma Living Overview of the Evidence (L-OVE), sistema que permite la actualización periódica de la evidencia.

C. SÍNTESIS DE EVIDENCIA

Resumen de la evidencia identificada

No se identificaron revisiones sistemáticas que respondan la pregunta. Se extendió la búsqueda a través de guías clínicas, síntesis amplia y citación cruzada, sin identificar estudios relevantes.

Tabla 1: Resumen de la evidencia seleccionada

Revisión Sistemática	0
Estudios primarios	0

Estimador del efecto

No aplica.

Metanálisis

No aplica.

Tabla de Resumen de Resultados (Summary of Findings)

REALIZAR INTERVENCIONES PSICOSOCIALES FUERA DE ESPACIOS DE SALUD (BARRIO/ESCUELA) COMPARADO CON REALIZAR INTERVENCIONES PSICOSOCIALES DENTRO DE ESPACIOS DE SALUD PARA MENORES DE 20 AÑOS CON TRASTORNO POR USO DE ALCOHOL Y DROGAS.			
Pacientes	Personas menores de 20 años con trastornos por uso de alcohol y otras drogas.		
Intervención	Realizar intervenciones psicosociales fuera de espacios de salud (barrio/escuela).		
Comparación	Realizar intervenciones psicosociales dentro de espacios de salud.		
Desenlaces	Efecto	Certeza de la evidencia (GRADE)	Mensajes clave en términos sencillos
Impacto clínico*	No se identificaron estudios que respondieran la pregunta de interés.	--	--
GRADE: Grados de evidencia Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. *Impacto clínico se refiere a cualquier desenlace que tenga impacto directo o indirecto en el manejo de los pacientes. Esto incluye a los desenlaces priorizados por el panel de expertos. Fecha de elaboración de la tabla: Enero, 2019.			

¹ Para revisar la metodología, las estrategias y los resultados de la búsqueda, favor revisar el informe "Búsqueda sistemática de evidencia de los efectos deseables e indeseables" en la sección de método de la Guía de Práctica Clínica respectiva.

Referencias

No aplica.