

## INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

### Guía de Práctica Clínica Trasplante Renal- 2018

#### **EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON TRASPLANTE RENAL, EN EL ESQUEMA DE MANTENCIÓN, SE DEBE USAR CORTICOIDES COMPARADO CON NO USAR?**

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación<sup>1</sup>.

#### **PRECIOS REFERENCIALES**

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias de usar corticoides comparado con no usar corticoides en el esquema de mantención en población pediátrica con trasplante renal, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla N°1. Precios referenciales

Ítem	Utilizar corticoides en población pediátrica con trasplante renal	No utilizar corticoides en población pediátrica con trasplante renal
Prednisona 20 mg/día/año	\$ 25 por comprimido <b>Total \$9.125 al año</b>	-----

\*El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Referencias:

1. Mercado Público + IVA 2018

<sup>1</sup> Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.