Octubre, 2018

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Trasplante Renal- 2018

EN PERSONAS CON TRASPLANTE RENAL CON ALTO RIESGO DE RETRASO DE LA FUNCIÓN DEL INJERTO ¿SE DEBE REALIZAR INDUCCIÓN CON ANTAGONISTAS DE RECEPTOR IL-2 VERSUS ANTICUERPO POLICLONAL (CONEJO)? PARA ESTA PREGUNTA SE CONSIDERA COMO FACTORES DE RETRASO DE FUNCIÓN INJERTO:

– DCE

– IF >24H

– PCR PREVIO A LA EXTRACCION

– SCR >1,5MG/DL

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación[1].

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los preciso referenciales de las prestaciones sanitarias de realizar inducción con Antagonistas de receptor IL-2 en comparación con realizar inducción con Anticuerpo Policlonal (conejo) en personas con trasplante renal con alto riesgo de retraso de la función del injerto, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

[1] Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.

Octubre, 2018

Ítem	**Realizar inducción con Antagonistas de receptor IL-2 en personas con trasplante renal con alto riesgo de retraso en la función del injerto**	**Realizar inducción con Anticuerpo policlonal (conejo) en personas con trasplante renal con alto riesgo de retraso en la función del injerto**
Basiliximab (Frasco ampolla 20 mg liofilizado+ ampolla de 5 ml solvente)[1]	**$ 1.174.720**[1] (1 frasco ampolla) x día, según corresponda	
TIMOGLOBULINA (ATG) ampollas de 25mg liofilizado ***Dosis:*** 1-3mg/kg (dosis máxima 6mg/kg).		Para una persona de 70 kg/peso Cada ampolla contiene 25mg Indicación: 3mg/kg/dosis aprox 9 ampollas por día =$1.476.747 Indicación: 6mg /kg/dosis aprox 18 ampollas =$5.578.882 **Más** **Profilaxis con Valganciclovir=1.600.000 por mes por 3 meses: $4.800.000**
Total	**$1.174.720**	**Rango de $6.276.747 a $7.753.494**

*El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Referencias:

1. Mercado público. Precio más IVA.