SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

# RECOMENDACIÓN TRATAMIENTO

# INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

## Guía de Práctica Clínica de Urgencias odontológicas ambulatorias: infecciones de origen dentario

**EN PERSONAS CON DENTICIÓN PERMANENTE Y DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN DE ORIGEN DENTARIO (FLEGMÓN, ABSCESO DE ESPACIOS ANATÓMICOS), EN ATENCIÓN DE URGENCIA AMBULATORIA, QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN ¿SE DEBE "INICIAR TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN FORMA PRECOZ (DENTRO DE LOS PRIMEROS 60 MINUTOS)" EN COMPARACIÓN A "INICIAR TRATAMIENTO TARDÍO (DESPUÉS DE 2 HORAS)"?**

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología "*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*" son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes, aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo[1].

## ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** de *personas con dentición permanente y diagnóstico de infección de origen dentario (flegmón, absceso de espacios anatómicos), en atención de urgencia ambulatoria, que requieren hospitalización* respecto a *"iniciar tratamiento antibiótico en forma precoz (dentro de los primeros 60 minutos)"* en comparación a *"iniciar tratamiento tardío (después de 2 horas)".*

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS.

Todas las estrategias de búsqueda fueron realizadas durante el año 2019.

[1] Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf

(Ver detalle en Anexo 1 "*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*").

## SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos pertinentes y se realizó un resumen por pregunta, a continuación un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

Todas las estrategias de búsqueda fueron realizadas durante el año 2019.

**SINTESIS DE EVIDENCIA**

No se identifica estudios que evalúen valores y preferencias de *personas con dentición permanente y diagnóstico de infección de origen dentario (flegmón, absceso de espacios anatómicos), en atención de urgencia ambulatoria, que requieren hospitalización* respecto a *"iniciar tratamiento antibiótico en forma precoz (dentro de los primeros 60 minutos)"* en comparación a *"iniciar tratamiento tardío (después de 2 horas)"*.

## REFERENCIAS

B. Al-Nawas & C. Walter & T. Morbach & N. Seitner, Clinical and microbiological efficacy of moxifloxacin versus amoxicillin/clavulanic acid in severe odontogenic abscesses: a pilot study, Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2009) 28:75–82.

## ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

| 1. Términos de búsqueda | |
|---|---|
| (dental abscess AND antibiotics) AND ("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation" [Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities" [tiab] OR "patient* utility" [tiab] OR "health utility" [tiab] OR "health utilities" [tiab] OR “acceptance”[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR “engaging patients”[tiab] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR “Time Trade-Off”[tiab] OR “Prospective Measure of Preference”[tiab] OR “prospective measure of preference time trade-off”[tiab] OR “willingness to trade” OR “Treatment Tradeoff Method”[tiab]) | |
| **Resultados de la búsqueda** | |
| Base de datos | Pubmed |
| N° de artículos obtenidos | 8 |
| N° de artículo seleccionados por título/abstract | 0 |
| N° de artículos seleccionados finales | 0 |

| 2. Términos de búsqueda | |
|---|---|
| ("Periodontal Abscess"[Mesh] AND antibiotics) AND ("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation" [Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities" [tiab] OR "patient* utility" [tiab] OR "health utility" [tiab] OR "health utilities" [tiab] OR “acceptance”[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR “engaging patients”[tiab] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR “Time Trade-Off”[tiab] OR “Prospective Measure of Preference”[tiab] OR “prospective measure of preference time trade-off”[tiab] OR “willingness to trade” OR “Treatment Tradeoff Method”[tiab] OR "Quality of Life"[Mesh] OR "Health related quality of life" [tiab]) | |
| **Resultados de la búsqueda** | |
| Base de datos | Pubmed |
| N° de artículos obtenidos | 2 |
| N° de artículo seleccionados por título/abstract | 0 |
| N° de artículos seleccionados finales | 0 |

| 3. Términos de búsqueda | |
|---|---|
| | |
| **Resultados de la búsqueda** | |
| Base de datos | PubMed |
| N° de artículos obtenidos | 0 |
| N° de artículo seleccionados por título/abstract | 0 |
| N° de artículos seleccionados finales | 0 |

| 4. Términos de búsqueda | |
|---|---|
| | |
| **Resultados de la búsqueda** | |
| Base de datos | Lilacs |
| N° de artículos obtenidos | 25 |
| N° de artículo seleccionados por título/abstract | 0 |
| N° de artículos seleccionados finales | 0 |