

RECOMENDACIÓN T.1

INFORME DE COSTOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica de Tratamiento Médico en Personas de 55 años y más con Artrosis de Cadera y/o Rodilla, Leve o Moderada

PREGUNTA: EN PERSONAS MAYORES DE 55 AÑOS CON DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE ARTROSIS DE CADERA Y/O RODILLA, LEVE O MODERADA ¿SE DEBE USAR PARACETAMOL 1000 A 4000 MG COMO PRIMERA LÍNEA EN COMPARACIÓN A NO USAR?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

COSTOS REFERENCIALES

A continuación, se muestran los precios referenciales de usar paracetamol 1.000 a 4.000 mg, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla. Precios referenciales

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de las prestaciones sanitarias, dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

ítem	Intervención: usar paracetamol 1000 a 4000 mg diario
Paracetamol con protección entérico 1 GR ¹	\$ 184
1.000 mg	\$ 184
4.000 mg	\$ 738
Total tratamiento mensual	Rango: \$ 5.534 a \$22.134
Paracetamol 500 MG ¹	\$ 10
1.000 mg	\$ 19
4.000 mg	\$ 76
Total tratamiento mensual	Rango: \$571 a \$2.285

Referencias:

1. Precio de compra por Establecimientos de Salud Públicos a través de plataforma Mercado Público, al 2018. Precio incluye IVA.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.