



SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
 DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

INFORME DE COSTOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica COVID-19

Pregunta: En personas con sospecha o diagnóstico de covid-19 ¿Se debe “usar hidroxyclo-roquina” en comparación a “no usar”?

Uno de los dominios a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

Las posibles respuestas a este dominio son: costos importantes, costos moderados, costos y ahorros pequeños, ahorros moderados, ahorros importantes, varía y no lo sé. Cabe mencionar que este dominio hace alusión a los recursos adicionales o costos incrementales de la intervención evaluada respecto a su comparador.

Requerimiento:	Hidroxyclo-roquina
Tecnología:	Medicamento
Registro ISP	Si
Problema de salud	COVID-19
Alternativa (si aplica)	No aplica
Propósito/ contexto	Costo anual por paciente desde la perspectiva del sistema público de salud chileno.
Lugar y fecha:	Oficinas de Minsal-Chile, agosto de 2020.
Supuestos:	<ul style="list-style-type: none"> El precio de un comprimido recubierto de 200 mg. de Hidroxyclo-roquina es de \$59 (considerando IVA y comision de CENABAST). Corresponde al precio de última compra de CENABAST (Orden de Compra: 621-332-SE19).

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.

Posología:	<ul style="list-style-type: none"> Se utiliza posología de medicamento descrita en estudio de Horby et al., (2020) para pacientes con COVID-19 hospitalizados (ensayo RECOVERY https://www.recoverytrial.net/). En dicho estudio se recomienda una dosis de carga de 4 tabletas (800 mg) a las cero y a las 6 horas, seguidas de 2 tabletas (400 mg) comenzando a las 12 horas después de la dosis inicial y luego cada 12 horas durante los siguientes 9 días o hasta el alta.
Estado de elaboración:	Preliminar: Sujeto a modificación por evidencia científica, clínica, precios, tipo de cambio, etc.
Resultados:	Costo de tratamiento por paciente con Hidroxicloroquina es de \$2.609 pesos chilenos.
Conclusión:	De acuerdo a la posología de estudio RECOVERY y precios de CENABAST, el costo por paciente de tratamiento con Hidroxicloroquina es de \$2.609 para pacientes con COVID-19 hospitalizados.
Referencias:	Horby, P., Mafham, M., Linsell, L., Bell, J., Staplin, N., Emberson, J., Wiselka, M., Ustianowski, A., Elmahi, E., Prudon, B., Whitehouse, A., Felton, T., Williams, J., Faccenda, J., Underwood, J., Baillie, K., Chappell, L., Faust, S., Jaki, Th., Landray, M. (2020). Effect of Hydroxychloroquine in Hospitalized Patients with COVID-19: Preliminary results from a multi-centre, randomized, controlled trial medRxiv 2020.07.15.20151852; doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.15.20151852 https://www.cenabast.cl/compras-cenabast/
Otros:	Se utiliza el precio de Reumazine, medicamento bioequivalente de Hidroxicloroquina.