

RECOMENDACIÓN Dg.2

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica de Depresión en Adolescentes - 2018

PREGUNTA: EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS ¿SE DEBE REALIZAR TAMIZAJE DE DEPRESIÓN EN COMPARACIÓN A NO REALIZAR?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** de personas menores de 15 años respecto realizar tamizaje de riesgo suicida.

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un resumen por pregunta,

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

a continuación un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

Resumen de evidencia

Un estudio cualitativo (1) realizado con el objetivo de comprender las opiniones de los pacientes pediátricos con respecto a las pruebas de tamizaje de riesgo de suicidio incluyó a pacientes de 10 a 21 años (edad promedio 14.6 años) y realizó entrevistas con la pregunta, "¿cree que las enfermeras de emergencias deben preguntar a los niños sobre el suicidio/pensamientos sobre hacerse daño a sí mismos ... por qué / por qué no?".

De los 156 pacientes que participaron en el estudio, 106 (68%) se presentaron al servicio de urgencias con problemas no psiquiátricos y 50 (32%) presentaron problemas psiquiátricos. La edad media (DE) de los pacientes fue de 14.6 (2.8) años (rango, 10-21 años), y el 56% de la muestra fue femenina. Todos los pacientes respondieron la pregunta de interés y 149 (96%) de 156 pacientes apoyaron la idea de que las enfermeras deberían preguntar a los jóvenes sobre el suicidio en el servicio de urgencias. Los 5 temas respaldados con mayor frecuencia fueron: (1) identificación de jóvenes en riesgo (31/156, 20%), (2) deseo de sentirse conocido y comprendido por los clínicos (31/156, 20%), (3) ayuda y recursos para conexión de jóvenes (28/156, 18%), (4) prevención de conductas suicidas (25/156, 16%) y (5) falta de otras personas con quienes hablar sobre estos temas (19/156, 12%).

Los autores concluyen que los pacientes pediátricos en el servicio de urgencias apoyan el examen de detección de suicidio y que el trabajo adicional debe evaluar el impacto de la detección del riesgo de suicidio en la práctica y vincular los esfuerzos de detección con intervenciones basadas en la evidencia.

REFERENCIAS

1. Ballard ED, Bosk A, Snyder D, Pao M, Bridge JA, Wharff EA, et al. Patients' Opinions About Suicide Screening in a Pediatric Emergency Department. *Pediatr Emerg Care* [Internet]. 2012 Jan [cited 2018 Dec 13];28(1):34–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22193697>

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
<p>Filtro: Adolescent attitudes about Screening for Suicide Risk. Últimos 10 años. (("adolescent"[MeSH Terms] OR "adolescent"[All Fields]) AND ("attitude"[MeSH Terms] OR "attitude"[All Fields] OR "attitudes"[All Fields]) AND ("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[All Fields] OR "screening"[All Fields] OR "mass screening"[MeSH Terms] OR ("mass"[All Fields] AND "screening"[All Fields]) OR "mass screening"[All Fields] OR "screening"[All Fields] OR "early detection of cancer"[MeSH Terms] OR ("early"[All Fields] AND "detection"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "early detection of cancer"[All Fields]) AND ("suicide"[MeSH Terms] OR "suicide"[All Fields]) AND ("risk"[MeSH Terms] OR "risk"[All Fields])) AND ("loattrfull text"[sb] AND "2008/11/09"[PDat] : "2018/11/06"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms])</p>	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	73
N° de artículo seleccionados por título/abstract	1
N° de artículos seleccionados finales	1