

RECOMENDACIÓN T.10

INFORME DE COSTOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica de Depresión en Adolescentes - 2018

PREGUNTA: EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN Y SUICIDALIDAD ¿SE DEBE AGREGAR RISPERIDONA COMO POTENCIADOR A INHIBIDORES SELECTIVOS DE RECAPTURA DE SEROTONINA (ISRS) POR SOBRE USAR SOLO INHIBIDORES SELECTIVOS DE RECAPTURA DE SEROTONINA (ISRS)?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

COSTOS REFERENCIALES

A continuación, se muestran los precios referenciales de agregar risperidona como potenciador a inhibidores selectivos de recaptura de serotonina (ISRS) por sobre usar solo inhibidores selectivos de recaptura de serotonina (ISRS), de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla. Precios referenciales

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de las prestaciones sanitarias, dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Fármacos	Intervención: ISRS	Comparación: ISRS+risperidona
ESCITALOPRAM 10 MG ¹	\$ 47,60	\$ 47,60
ESCITALOPRAM 20 MG ¹	\$ 125	\$ 125
FLUOXETINA 20 MG ¹	\$ 14,30	\$ 14,30
SERTRALINA 100 MG ¹	\$ 59,50	\$ 59,50
RISPERIDONA 1 MG ¹	-	\$ 163,03
Total considerando 1 cp día x 30 días	\$ 1.071-\$ 3.750	\$ 5.320-\$ 8.640

Referencias:

1. Precio de compra de Establecimientos de Salud Públicos a través de plataforma Mercado Público. Adjudicación 2018 (el precio incluye IVA).

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.