

RECOMENDACIÓN

INFORME DE COSTOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica de Artritis idiopática juvenil

A. PREGUNTA CLÍNICA

En personas con artritis idiopática juvenil sistémica no respondedora a tocilizumab ¿Se debe “usar anti interleuquina 1” en comparación a “no usar”?

B. PREGUNTA CLÍNICA PRECISADA

En personas con artritis idiopática juvenil sistémica no respondedora a tocilizumab ¿Se debe “usar anti interleuquina 1” (canakinumab) en comparación a “usar anti-TNF”?”

Uno de los dominios a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

Las posibles respuestas a este dominio son: costos extensos, costos moderados, costos y ahorros despreciables, ahorros moderados, ahorros extensos, varía y no lo sé. Cabe mencionar que este dominio hace alusión a los recursos adicionales o costos incrementales de la intervención evaluada respecto a su comparador.

La determinación de las distintas categorías de costos, se realizó desde la perspectiva del sistema público de salud chileno, utilizando la mediana de gasto por paciente anual en cada uno de los 80 problemas de salud GES para categorizar al gasto anual por paciente como costos/ahorros despreciables y costos/ahorros moderados², y la mediana de gasto anual de pacientes con cobertura de la Ley 20.850 (Ricarte Soto) constituiría un límite para categorizar al gasto anual por paciente como costos/ahorros moderados y costos/ahorros extensos³

Costos:

- Si el costo por paciente anual incremental de una intervención respecto a su comparador es **inferior a \$ 674.672²**, dicha intervención presenta **costos despreciables**.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.

² Según Estudio Verificación de Costos GES 2018 este límite para costo despreciable se encontraría entre los problemas de salud Depresión en mayores de 15 años y Trastorno bipolar en personas de 15 años y más.

- Si el **costo** por paciente anual incremental de una intervención respecto a su comparador es **igual o superior a \$ 674.672** y menor a **\$4.502.112³**, dicha intervención presenta **costos moderados**.
- Si el costo por paciente anual incremental de una intervención respecto a su comparador es **igual o superior a \$4.502.112**, dicha intervención presenta **costos extensos**.

Ahorros:

- Si el ahorro por paciente anual incremental de una intervención respecto a su comparador es **inferior a \$ 674.672**, dicha intervención presenta **ahorros despreciables**.
- Si el ahorro por paciente anual incremental de una intervención respecto a su comparador es **igual o superior a \$ 674.672** y menor a **\$4.502.112**, dicha intervención presenta **ahorros moderados**.
- Si el ahorro por paciente anual incremental de una intervención respecto a su comparador es **igual o superior a \$4.502.112**, dicha intervención presenta **ahorros extensos**.

COSTOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los costos referenciales de las prestaciones sanitarias “usar anti interleuquina 1 y de no usarla”, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

³ Según información de ejecución presupuestaria de Ley Ricarte Soto generada por FONASA este límite para alto costo correspondería al costo anual paciente para Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente.

Tabla N° 1. Costos referenciales

Ítem	Presentación	Posología	Precio unitario	Cantidad	Precio anual de usar interleuquina 1	Precio de no usar interleuquina 1
Canakinumab ¹	Vial 150 mg s/c	2mg por kg en pacientes entre 15-40kg	\$10.164.232	7	\$71.149.624	
Canakinumab ¹	Vial 150 mg s/c	4mg por kg en pacientes entre 7,5 y 15 kg. Mensual (tope de 150 mg)	\$10.164.232	7	\$71.149.624	-
Día cama ²	Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno		\$12.920	7	\$90.440	
Etanercept ³	Vial contiene 50 mg s/c	25 mg administrados dos veces a la semana	\$151.427	52	-	\$7.874.204
Administración ⁴			\$18.960	104		\$1.971.840
TOTAL					\$71.240.064	\$8.860.124

Fuente:

- (1) Vademecum europeo
- (2) Arancel FONASA Modalidad Atención Institucional (MAI) 2019.
- (3) Elaboración FONASA