

RECOMENDACIÓN T.6

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica de Depresión en Adolescentes - 2018

PREGUNTA: EN ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN MODERADA O GRAVE ¿SE DEBE USAR INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTURA DE SEROTONINA (ISRS) EN COMPARACIÓN A NO USAR?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** de personas menores de 15 años con diagnóstico de depresión respecto usar inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS).

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un resumen por pregunta,

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

a continuación un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

Resumen de evidencia

Se realizó un análisis retrospectivo de cohortes utilizando datos de reclamaciones de una población del estado inscrita en Medicaid de 1650 jóvenes (de 5 a 17 años) con nuevos episodios de depresión entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de diciembre de 2007. Alrededor de la mitad (49.5%) de los jóvenes se adhirieron a la medicación antidepresiva durante la fase aguda, y el 42% de estos fueron adherentes durante la fase de continuación; El 21% fue adherente en ambas fases de tratamiento (1).

La falta de adherencia a los medicamentos antidepresivos es común entre los niños y adolescentes. Los hallazgos del estudio subrayan la necesidad de que los clínicos brinden atención de acuerdo con las pautas, evalúen la adherencia y desarrollen intervenciones que mejoren la adherencia, en particular para los subgrupos vulnerables (1).

REFERENCIAS

1. Fontanella CA, Bridge JA, Marcus SC, Campo J V. Factors Associated with Antidepressant Adherence for Medicaid-Enrolled Children and Adolescents. *Ann Pharmacother* [Internet]. 2011 Jul 20 [cited 2019 Mar 21];45(7–8):898–909. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775691>

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Términos de búsqueda	
("Serotonin Uptake Inhibitors"[Mesh] AND "Adolescent"[Mesh]) AND ("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation" [Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities" [tiab] OR "patient* utility" [tiab] OR "health utility" [tiab] OR "health utilities" [tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "Time Trade-Off"[tiab] OR "Prospective Measure of Preference"[tiab] OR "prospective measure of preference time trade-off"[tiab] OR "willingness to trade" OR "Treatment Tradeoff Method"[tiab])	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	120
N° de artículo seleccionados por título/abstract	5
N° de artículos seleccionados finales	1