

RECOMENDACIÓN T.8

INFORME DE COSTOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica de Depresión en Adolescentes - 2018

PREGUNTA: EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS CON DEPRESIÓN RESISTENTE ¿SE DEBE CAMBIAR O POTENCIAR ISRS EN COMPARACIÓN A USAR VENLAFAXINA?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

COSTOS REFERENCIALES

A continuación, se muestran los precios referenciales de cambiar o potenciar ISRS en comparación a usar venlafaxina, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla. Precios referenciales

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de las prestaciones sanitarias, dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

FÁRMACOS	Intervención: Cambiar o potenciar IRSS	Comparación: Usar Venlafaxina
VENLAFAXINA 75 MG ¹	-	\$ 35,60
VENLAFAXINA 150 MG ¹		\$ 71,20
ESCITALOPRAM 10 MG ¹	\$ 47,60	-
ESCITALOPRAM 20 MG ¹	\$ 125	-
FLUOXETINA 20 MG ¹	\$ 14,30	-
FLUOXETINA 40 MG ¹	\$ 28,60	
SERTRALINA 100 MG ¹	\$ 59,50	-
Total rango precio por comprimido:	\$14,3 - \$125	\$ 35,60 - \$71,20
Total considerando 1 cp día x 30 días	\$ 1.071-\$ 3.750	\$ 1.068-\$ 2.136

Referencias:

1. Precio de compra de Establecimientos de Salud Públicos a través de plataforma Mercado Público. Adjudicación 2018 (el precio incluye IVA).

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.