Noviembre, 2018

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

RECOMENDACIÓN T.8
INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES
Guía de Práctica Clínica de Depresión en Adolescentes - 2018

PREGUNTA: EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS CON DEPRESIÓN RESISTENTE ¿SE DEBE CAMBIAR O POTENCIAR ISRS EN COMPARACIÓN A USAR VENLAFAXINA?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología "*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*" son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo[1].

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** de personas menores de 15 años con depresión resistente a tratamiento con ISRS respecto a cambiar o potenciar ISRS en comparación a usar venlafaxina.

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 "*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*").

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un resumen por pregunta,

[1] Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf

a continuación un resumen de las resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

Resumen de evidencia

Un estudio[1] exploró actitudes de los padres sobre beneficios y riesgos del uso de antidepresivos en pediatría en relación con otra opción de tratamiento común, la psicoterapia. También exploró variables sociodemográficas y de tratamiento que podrían influir en estas percepciones. Se aplicó un cuestionario que evaluaba características demográficas, historial de tratamiento y actitudes hacia la psicoterapia y los medicamentos antidepresivos a 501 cuidadores de niños que acudían a centros comunitarios de salud mental. RESULTADOS. La psicoterapia fue percibida como beneficiosa y con pocos riesgos, mientras que los medicamentos antidepresivos fueron percibidos como beneficiosos y riesgosos. 52% de los padres creyó "un poco" a "fuertemente" que los antidepresivos podrían hacer que los niños quieran hacerse daño a sí mismos. Una leve mayoría de los padres esperaba que sus hijos vieran al médico al menos cada pocas semanas si se les prescribía un antidepresivo. CONCLUSIONES: Al educar a los padres sobre medicamentos, los prescriptores deben saber que los padres y muchos cuidadores pueden esperar un nivel más alto de monitoreo médico del uso cuando de utilizan antidepresivos pediátricos que el disponible en la mayoría de las comunidades.

REFERENCIAS

1. K. Hansen, T.L. Webb, P. Sheeran, G. Turpin Attitudes and preferences towards self-help treatments for depression in comparison to psychotherapy and antidepressant medication Behavioural and Cognitive Psychotherapy (2015), 10.1017/S1352465815000041

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Términos de búsqueda	
("Depressive Disorder"[Mesh] OR "Depression"[Mesh]) AND ("Venlafaxine Hydrochloride"[Mesh] OR "venlafaxine"[tiab]) AND ("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation" [Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities" [tiab] OR "patient* utility" [tiab] OR "health utility" [tiab] OR "health utilities" [tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "Time Trade-Off"[tiab] OR "Prospective Measure of Preference"[tiab] OR "prospective measure of preference time trade-off"[tiab] OR "willingness to trade" OR "Treatment Tradeoff Method"[tiab] OR "parent* satisfaction" OR "Parental Perspectives"[tiab] OR "parents views" OR "Parental Notification"[Mesh])	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	60
N° de artículo seleccionados por título/abstract	1
N° de artículos seleccionados finales	1