

RECOMENDACIÓN T.9

INFORME DE COSTOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica de Depresión en Adolescentes - 2018

PREGUNTA: EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS CON DEPRESIÓN CON AUTOAGRESIONES O SUICIDALIDAD Y QUE REQUIEREN ANTIPSICÓTICOS ¿SE DEBE USAR QUETIAPINA EN COMPARACIÓN A USAR ARIPIPRAZOL?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

COSTOS REFERENCIALES

A continuación, se muestran los precios referenciales de usar quetiapina en comparación a usar aripiprazol, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla. Precios referenciales

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de las prestaciones sanitarias, dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

ítem	Intervención: usar quetiapina	Comparación: usar aripiprazol
QUETIAPINA 25 MG ¹	\$ 28	
ARIPIPRAZOL 10 MG ¹		\$ 200
Total considerando 1 cp día x 30 días	\$ 840	\$ 6000

Referencias:

1. Precio de compra de Establecimientos de Salud Públicos a través de plataforma Mercado Público. Adjudicación 2018 (el precio incluye IVA).

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.