



Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia
División de Planificación Sanitaria
Subsecretaría de Salud Pública

INFORME DE COSTOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica COVID-19

Pregunta: En personas con diagnóstico de COVID-19 ¿Se debe “usar budesonida” en comparación a “no usar”?

Uno de los dominios a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

Las posibles respuestas a este dominio son: costos importantes, costos moderados, costos y ahorros pequeños, ahorros moderados, ahorros importantes, varía y no lo sé. Cabe mencionar que este dominio hace alusión a los recursos adicionales o costos incrementales de la intervención evaluada respecto a su comparador.

REPORTE DE COSTOS

Tecnología:	BUDESONIDA
Registro ISP	Si
Problema de salud	COVID-19
Propósito/ contexto	Costo de tratamiento por paciente desde la perspectiva del sistema público de salud chileno.
Lugar y fecha:	Oficinas de Minsal-Chile, mayo de 2021.
Precios:	<ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza el menor de los precios de los últimos seis meses de órdenes de compra de plataforma de Mercado Público efectuadas desde enero a mayo de 2021 para una presentación de 200ug de Budesonida (OC: 621-361-SE21). • Dado lo anterior, el precio utilizado es de \$1.716 por presentación de 200ug. (considera IVA y comisión de CENABAST).
Posología:	Se considera una dosis de 800ug de budesonida inhalada 2 veces al día durante 14 días(1). Se consideró la dosis máxima para efectos del costeo.
Estado de elaboración:	Preliminar: Sujeto a modificación por evidencia científica, clínica, precios, tipo de cambio, etc.
Resultados:	El costo de tratamiento por paciente con budesonida es de \$192.190.
Referencias:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ramakrishnan S, Nicolau D V, Langford B, Mahdi M, Jeffers H, Mwasuku C, et al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial. <i>Lancet Respir Med</i> [Internet]. 2021 Apr;19(21):1–10. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00160-0