Octubre 2020

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

INFORME DE COSTOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica COVID-19

Pregunta: En personas con neumonía por COVID-19 ¿Se debe "usar dexametasona" en comparación a "no usar"?

Uno de los dominios a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación[1].

Las posibles respuestas a este dominio son: costos importantes, costos moderados, costos y ahorros pequeños, ahorros moderados, ahorros importantes, varía y no lo sé. Cabe mencionar que este dominio hace alusión a los recursos adicionales o costos incrementales de la intervención evaluada respecto a su comparador.

[1] Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.

Tecnología:	Dexametasona
Registro ISP	Si
Problema de salud	COVID-19
Propósito/ contexto	Costo anual por paciente desde la perspectiva del sistema público de salud chileno.
Lugar y fecha:	Oficinas de Minsal-Chile, agosto de 2020.
Supuestos:	• El precio de la ampolla de 4 mg/ml de Dexametasona es de $101 (considerando IVA y comisión de CENABAST). Corresponde al precio de última compra de CENABAST (Orden de Compra: 621-325-SE19).
Posología:	• Se utiliza posología de medicamento descrita en estudio RECOVERY (https://www.recoverytrial.net/) para pacientes hospitalizados con COVID-19. En dicho estudio se recomienda una dosis diaria de 6 mg. por 10 días.
Resultados:	Costo de tratamiento por paciente con Dexametasona es de $1.514 pesos chilenos.
Conclusión:	De acuerdo a la posología de estudio RECOVERY y precios de CENABAST, el costo de tratamiento por paciente con Dexametasona es de $1.514 pesos para pacientes con COVID-19 hospitalizados.
Referencias:	RECOVERY Collaborative Group. "Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19—preliminary report." New England Journal of Medicine (2020) https://www.cenabast.cl/compras-cenabast/