

# ES POSITIVO SABER: HABLEMOS DE PrEP

Para mayor información puedes llamar a

**FONOSIDA**  
800 378 800

LLAME A SALUD RESPONDE  
**600-360-7777**

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,  
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Infórmate sobre la  
**prevención vía oral**  
del VIH a través de  
la estrategia de  
prevención **PrEP**.



# ¿QUÉ ES LA PrEP?



Es un **tratamiento preventivo y de preexposición al VIH** y consiste en la toma de un medicamento para reducir el riesgo de adquirirlo.

- ◆ La PrEP no previene otras infecciones de transmisión sexual.
- ◆ El uso correcto del condón te protege de las infecciones de transmisión sexual.

## ¿A QUIÉNES ESTÁ DESTINADO?

A personas de 18 años y más con conductas sexuales que las exponen a un mayor riesgo de adquirir el VIH.

## ¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

Las personas que se atienden en el sistema público, y son beneficiarios de FONASA y/o PRAIS

## ESTÁ DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES CENTROS:

### REGIÓN METROPOLITANA

- Centro de Atención de Infectología, CRS Cordillera Oriente
- Centro de Atención de Infectología, Hospital Padre Hurtado
- Centro de Atención de Infectología, Hospital El Carmen
- Centro de Atención de Infectología/UNACCESS, Hospital Barros Luco
- UNACCESS, Hospital San José
- UNACCESS, Hospital San Juan de Dios

### REGIONES

- UNACCESS, Hospital de Arica
- Centro de Atención de Infectología, Hospital de Antofagasta
- Centro de Atención de Infectología, Hospital San Fernando
- Centro de Atención de Infectología, Hospital de Temuco
- Centro de Atención de Infectología, Hospital de Puerto Montt

Las **personas que usan PrEP** deben ser adherentes al fármaco, es decir, respetar dosis y horarios indicados.

Debe estar **bajo supervisión médica** y acudir a control cada 3 meses para evaluar adherencia y realizar exámenes de control.

Además, **recibirán consejería** en prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) con entrega de preservativos, lubricantes y material educativo.

**PrEP puede producir efectos secundarios leves** que por lo general desaparecen durante el primer mes.